

Endoscopische voorhoofdslift

Veel mensen denken hinder te hebben van overhangende bovenoogleden. Vaak blijkt dit mede te worden veroorzaakt door laaghangende wenkbrauwen. Doordat de wenkbrauwen lager hangen dat ze horen, drukt de huid op de oogleden. Dit geeft een zwaar gevoel. Hierbij geeft een correctie van de oogleden niet het gewenste resultaat, maar moeten de wenkbrauwen in een hogere positie gebracht worden. Dit kan doormiddel van een voorhoofdslift.

Vergoeding

De vergoeding van de operatie is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en hoe u verzekerd bent. De zorgverzekeraar stelt criteria waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Als de plastisch chirurg een machtiging aanvraagt, bent u zelf verantwoordelijk voor het proces hiervan. Houdt hierover contact met uw zorgverzekeraar.

- Indien geen sprake is van een vergoeding kunt u ervoor kiezen om de operatie zelf te betalen. Als u hiervoor kiest dan ontvangt u een offerte met een bedenktijd van 2 maanden.

De operatie

De voorhoofdslift wordt uitgevoerd door middel van een kijkinstrument, de zogeheten endoscoop. Bij deze kijkoperatie wordt via enkele kleine sneetje in de behaarde hoofdhuid de wenkbrauwpositie hersteld. Het voordeel is dat het een relatief weinig ingrijpende operatie is.

De operatie wordt onder volledige verdoving uitgevoerd, in dagbehandeling.

Na de operatie

Doorgaans valt de pijn na een voorhoofdslift mee. Meestal blijft het bij een tijdelijk gespannen gevoel op de schedel. Hiervoor krijgt u medicatie. De dagen na de operatie kunt u blauwe en gezwollen ogen hebben wat in verloop van een week geleidelijk verdwijnt.

Risico's/complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat er een kleine kans op nabloeding, infectie of een verstoorde wondgenezing. Ook kan het voorkomen dat het gevoel pas later weer normaal wordt of dat een enkele keer een kleine zone een ongewoon of verminderd gevoel houdt. Geen enkel gezicht is helemaal symmetrisch en ook na een voorhoofdslift kan het voorkomen dat de ene wenkbrauw zich iets hoger bevindt dan de andere. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat er een zeer klein risico bestaat op een beschadiging van de zenuw die er voor zorgt dat de wenkbrauwen kunnen fronsen. Indien dit zich voordoet herstelt het zich ook meestal spontaan. Slechts zelden komt het voor dat dit blijvend is.

Leefregels

- Als u bijkomt uit de narcose zit er eventueel een drukverband om uw hoofd. Dit wordt de volgende dag verwijderd.
- Uw voorhoofd kan na de operatie minder gevoelig of zelfs ongevoelig zijn. Jeuk op het behaarde hoofd is een veelvoorkomend gevolg van de operatie. Ook zal uw voorhoofd wat gezwollen zijn. Bij de operatie is het noodzakelijk de wenkbrauwen iets hoger corrigeren. Dit kan tijdelijk een iets "verbaasde blik" opleveren. Ook kunt u "twee blauwe ogen" ontwikkelen als gevolg van uitzakken van een bloeduitstorting. Al deze bijkomstigheden verdwijnen weer binnen enkele weken.
- U mag na 1 dag weer douchen, nadat het verband is verwijderd.

Almelo

Zilvermew 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Vaak wordt een voorhoofdslift uitgevoerd in combinatie met een ooglidcorrectie.
- Het is van belang de eerste week met een extra kussen onder uw hoofd te slapen. Dit om zwelling in uw voorhoofd te beperken.
- De hechtingen/nietjes worden na 10 a 14 dagen op de polikliniek verwijderd.
- Geen zware lichamelijke arbeid, tillen of sporten gedurende 2-3 weken. Hierna is de stelregel "wat goed aanvoelt mag u doen".
- De pijnmedicatie wordt door de medisch specialist voorgeschreven bij ontslag uit het ziekenhuis.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze gerust, wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Contact

Bij vragen of problemen kunt u tijdens kantooruren (8.00 tot 16.30 uur) contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie via telefoonnummer:

088 708 52 45

Bij complicaties buiten kantooruren kunt u bellen met het ZGT (**088 708 78 78**) en u laten doorverbinden met de spoedeisende eerste hulp.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt