

## Medicijnprovocatie

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor

.....

Het onderzoek duurt ongeveer

.....

### Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u verschillende concentraties van het te testen medicijn toegediend (tablet, capsule of een drankje). De concentraties lopen op van een hele lage dosering tot een normale dosering. Tijdens het onderzoek wordt meerdere malen de longfunctie gemeten. De laborant(e) zal u hiertoe vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Op deze manier kan een eventuele luchtwegvernauwing worden gemeten. Ook andere klachten moet u tijdens de test aan de laborant(e) aangeven.

### Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van tevoren worden gestaakt (zie medicijnlijst z.o.z.), altijd eerst vooraf overleg met de allergoloog.
- Longmedicatie dient op tijd gestaakt te worden (zie medicijnlijst z.o.z.).
- Denk aan uw eigen lunchpakket. Tijdens het onderzoek mag u de afdeling niet verlaten!
- Eventueel leesmateriaal of iets dergelijks meenemen, gezien de lange testduur.
- B-blockers (bepaalde bloeddruk medicijnen) dienen 48 uur van tevoren worden gestaakt, altijd eerst vooraf overleg met de allergoloog.

### Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

### Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

### Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt).

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](http://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

## Medicijnenlijst t.b.v. medicijnprovocatie

### Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van te voren staken

Acrivastine	Lomudal
Aerius	Loratadine
Alimemazine	Mebhydroline
Allerfre	Mizolastine
Allergodil (Azelastine)	Mizollen
Atarax	Montelukast
Cetirizine	Nalcrom
Ciclosporine	Nedeltran
Claritine	Neoral
Clemastine	Oxatomide
Cromoglicinezuur	Periactin
Cyproheptadine	Polaramine
Desloratadine	Prevalin
Dexchlorfeniramine	Promethazine
Dimetindeen	Reactine
Dymista	Semprex
Ebastine	Singulair
Fenistil	Tavegil
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Terfenadine
Kestine	Tinset
Ketotifen	Xyzal
Levocetirizine	Zaditen
Livocab(Levocabastine)	Zyrtec

### Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van te voren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal

### Antidepressiva

#### 72 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog

Amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron

Dosulepine	Sarotex
Doxepine	Seroquel
Maprotiline	Sinequan
Mianserine	Tolvon
Mirtazapine	Trazodon
Nortrilen	Trazolan
Nortriptyline	Tryptizol

### Longmedicatie

#### 8 uur van te voren staken

Aerolin	Fenoterol
Airomir	Ipramol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Salamol
Berotec	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Bronchodual	Ventolin
Combivent	

### Longmedicatie

#### 24 uur van te voren staken

Airflubo	Oxis
Airflusal	Revlar
Anoro	Salflutin
AtectuRA	Salufer
Atimos	Salmeterol
Bevespi	Seretide
Bricanyl retard	Serevent
Bufoleer	Spiolto
Busalair	Spiriva
Cromoglicinezuur	Symbicort
Duoresp	Tilade
Duaktir-genuair	Tiotropium
Enerzair	Tavulus
Flutiform	Tiotrus
Foradil	Trixeo
Formoterol	Trimbow
Foster	Tregely
Indaceterol=Hirobriz, Onbrez	Umeclidinum=Incruse
Lomudal	Ultibro
Nedocromil	Xoterna
Olodateol=Striverdy	

**Longmedicatie, 48 uur van te voren staken**

Theofylline
Theolair retard

**Longmedicatie, 72 uur van te voren staken**

Montelukast
Singulair

**Bètablokkers, 48 uur van te voren staken,  
altijd na overleg met de allergoloog**

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

**Maag/darm medicijnen  
72 uur van te voren staken**

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
Famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	