

## Aspirine neusprovocatie

Met behulp van deze test kan worden geïnfereerd of het neusslijmvlies overgevoelig is voor aspirine. De test duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten.

### Verloop van het onderzoek

De gevoeligheid van het neusslijmvlies zal worden getest met behulp van een aspirine-oplossing. U krijgt de aspirine toegediend door middel van neusdruppels. Nadien wordt gekeken hoe het neusslijmvlies reageert aan de hand van een scorelijst en worden een aantal metingen verricht met een zogenaamde rhinomanometer.

### Vorbereidingen thuis

- Een aantal medicijnen moet voorafgaand aan de test worden gestaakt, raadpleeg hiervoor de bijgevoegde medicijnlijst (z.o.z.).
- B-blockers (bepaalde bloeddruk medicijnen) dienen 48 uur van te voren worden gestaakt, echter hierover altijd eerst vooraf overleg met de allergoloog.
- Antidepressiva dienen 72 uur van te voren worden gestaakt, echter hierover altijd eerst vooral overleg met de allergoloog.

### Tijdig afbellen test bij neusklachten

Als u verkouden bent, kan er geen goede meting plaatsvinden. De test moet dan worden verplaatst.

Als u enkele dagen voor de test neusklachten heeft en/of denkt dat u verkouden bent, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen, zodat er overleg kan plaatsvinden nog voor de test.

### Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

### Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

### Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt).

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](http://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

## Medicijnlijst t.b.v. neusprovocatie histamine

### Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van tevoren staken

acrivastine	mebhydroline
Aerius	mizolastine
alimemazine	Mizollen
Allerfre	Montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Neoral
Cetirizine	oxatomide
ciclosporine	Periactin
Claritine	Polaramine
clemastine	Prevalin
cromoglicinezuur	promethazine
cyproheptadine	Reactine
desloratadine	Rupatadine
dexchlorfeniramine	Rupafin
dimetindeen	Semprex
Dymista	Singulair
ebastine	Tavegil
fenistil	Telfast
fexofenadine	terfenadine
hydroxyzine	Tinset
Kestine	Xyzal
ketotifen	Zaditen
levocetirizine	Zyrtec
Livocab (Levocabastine)	
Lomudal	
loratadine	

### Medicijnen tegen hoest 72 uur van tevoren staken

Oxomemazine	
Toplexil	

### Neusspray 72 uur van tevoren staken

Allergodil	Levocabastine
Azelastine	Livocab

### Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van tevoren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine	Xonvea

### Maag/darm medicijnen 72 uur van tevoren staken

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
Famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	

### Antidepressiva 72 uur van tevoren staken, altijd in overleg met allergoloog.

Amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
Doxepine	Seroquel
Maprotiline	Sinequan
Mianserine	Tolvon
Mirtazapine	Trazodon
Nortrilen	Trazolan
Nortriptyline	Tryptizol

### B-Blockers 48 uur van tevoren staken, altijd in overleg met allergoloog.

Acebutalol	Metoprplol
Atenolol	Nebilet

Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propanolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

Allergocrom COMOD	Otrivin hooikoorts neusspray
Cromoglicinezuur	Prevalin 2%, 4%
Lomusol 2%, 4%	Vividrin

**Neusspray**
**2 weken van tevoren staken**
**Neusspray**
**3 weken van tevoren staken**

Avamys	Fluticasonpropionaat CF
Azelastine-fluticason	Fluticasonpropionaat CF
Beclomethason	Nasacort
Beconase	Nasonex
Budesonide	Rhinocort
Flixonase	Syntaris