

Adalimumab (Hyrimoz®) bij IBD

Uw behandelende medisch specialist en/of IBD verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Adalimumab (Hyrimoz®). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van de bijsluiter. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, kunt u daarmee bij uw behandelende medisch specialist of verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van ziekte van Crohn en chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken maar de huidige medicijnen kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking

Adalimumab behoort tot de zogenaamde biologische middelen tegen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn niet bekend is, wordt met patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in de darm een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies. Adalimumab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van menselijke eiwitten. Adalimumab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen de klachten (zoals diarree en buikpijn) af. Ook voelen veel patiënten zich over het algemeen

minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Adalimumab treedt over het algemeen snel op, dat wil zeggen binnen enkele weken. Adalimumab (Hyrimoz®) is een biosimilar. Deze is zo ontwikkeld dat het een bewezen vergelijkbare structuur en vergelijkbare kenmerken heeft als het originele biologische middel.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u start met Adalimumab is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten dan wel te behandelen. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van Adalimumab kan ertoe leiden dat de infectie actief wordt. Daarom zult u voor het starten met de behandeling op tuberculose onderzocht worden. Ook hepatitis B en C kunnen worden gecontroleerd, evenals HIV besmetting. Het is belangrijk dat u zelf let op andere bronnen en/of algemene verschijnselen van infecties. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

- Gezwollen lymfeklieren;
- Aanhoudend hoesten;
- Plotseling gewichtsverlies;
- Koorts.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Het is tevens belangrijk dat u let op andere bronnen van infecties zoals wonden of problemen met het gebit. Als u een infectie vermoedt, meld dit dan aan uw behandelende medisch specialist of verpleegkundige.

Gebruik en doseringen

Adalimumab wordt één keer per twee weken via onderhuidse injecties gegeven. In de eerste vier weken wordt Adalimumab in een hogere startdosering gegeven. Na deze periode is de gebruikelijke dosering 40 mg per twee weken. De injectie wordt door uzelf toegediend of eventueel door uw naaste. U ontvangt instructies van een verpleegkundige over de injectietechniek. Hoewel het misschien een eng idee is, blijkt het zelf spuiten in de praktijk mee te vallen en goed te leren. Wanneer u hulp van iemand anders krijgt bij het injecteren, is het noodzakelijk dat deze persoon eveneens getraind is.

U dient Adalimumab in de koelkast te bewaren. Na verloop van tijd kan de werkzaamheid van Adalimumab afnemen en is het soms nodig om de injectie wekelijks te geven. Adalimumab wordt soms als enige middel tegen colitis ulcerosa gebruikt, maar kan ook worden gecombineerd met andere afweer onderdrukkende middelen (azathioprine/ 6-mercaptopurine) of andere middelen tegen colitis ulcerosa. De combinatie van meerdere geneesmiddelen is vaak effectiever en zorgt voor minder afweerreacties op Adalimumab en minder antistofvorming tegen Adalimumab.

Interacties met andere geneesmiddelen

Adalimumab kan voor zover bekend veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen (behalve Anakinra en Abatacept). De combinatie met andere afweer onderdrukkende medicijnen geeft een

verhoogde kans op infecties. Overleg bij twijfel met uw medisch specialist.

Bijwerkingen

In de bijsluiter die met de Adalimumab geleverd wordt, staan alle beschreven bijwerkingen vermeld. Deze kunt u rustig nalezen.

De meest gemelde bijwerkingen zijn:

- Reacties op de injectieplaats zoals; pijn, zwelling bloeding, roodheid of jeuk;
- Infecties van de ademhalingswegen zoals; verkoudheid, loopneus, ontsteking van de bijholten, kortademigheid, longontsteking;
- Hoofdpijn;
- Spierpijn;
- Misselijkheid en braken;
- Huiduitslag;
- Wazig zien en oogpijn;
- Stemningswisselingen, angst of moeite met slapen.

Zeldzame bijwerkingen zijn onder andere zenuwaandoeningen en hartproblemen. Ook kan Adalimumab ervoor zorgen dat uw afweersysteem te veel wordt onderdrukt. Hierdoor kunnen bepaalde infecties, zoals luchtweginfectie of een urineweginfectie meer klachten geven en langer aanhouden. Mocht u tekenen hebben van een infectie zoals wonden, problemen met uw gebit, koorts en niet lekker zijn, en gaan deze klachten niet binnen enkele dagen over, neem dan contact op met uw medisch specialist of verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist of IBD-verpleegkundige.

Zwangerschap

Tot zover bekend lijkt het gebruik van Adalimumab gedurende de zwangerschap veilig te zijn. Adalimumab gaat echter over in het kind. Om het kind zonder Adalimumab geboren te laten worden kan Adalimumab in week 24 onderbroken worden. Vaak geldt dat opvlamming van de ziekte meer risico's met

zich meebrengt in de zwangerschap, dan het gebruik van Adalimumab. Overleg met uw medisch specialist wanneer u een zwangerschapswens hebt of zwanger bent en Adalimumab gebruikt.

Borstvoeding

Adalimumab gaat over in de borstvoeding. Tot nu toe zijn er geen schadelijke gevolgen gevonden bij kinderen die borstvoeding gebruikten. Overleg met uw medisch specialist/verpleegkundig specialist over het geven van borstvoeding tijdens gebruik van Adalimumab.

Autorijden

Adalimumab geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen gedurende de behandeling.

Vaccinaties

De griepvaccinatie en hepatitisvaccinatie zijn veilig tijdens de behandeling Adalimumab. Vaccinaties met verzwakte levende vaccins, zoals gele koorts of BCG moeten vermeden worden tijdens het gebruik van Adalimumab. Overleg met uw medisch specialist als u gevaccineerd moet worden.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen neem dan contact op met uw verpleegkundige. U kunt bellen naar het MDL-centrum, telefoonnummer 088 708 70 70.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Spuitinstructie

Sensoready® Autoinjector pen

Benodigde materialen


- Medicatieoverzicht;
- Voorgevulde Hyrimoz pen;
- Naaldencontainer;
- Afvalzakje.

Werkwijze

- Haal de voorgevulde pen 15-30 minuten voor de toediening uit de koelkast.
- Zorg voor een rustige omgeving.
- Controleer op het medicatieoverzicht de datum van injecteren.
- Controleer bij de Hyrimoz voorgevulde pen de houdbaarheidsdatum en dosering.
- Was uw handen.
- Bepaal de prikplaats.




- Reinig de huid op de gekozen injectieplaats met behulp van bijgeleverd alcoholgaasje. Raak de ontsmette huid niet meer aan voor de inspuiting.
- Draai de dop open in de richting van de pijlen.



- Neem de schoongemaakte huid in een plooi vast en plaats, met de andere hand, de voorgevulde pen in een rechte hoek (90 graden) op de huid.



- Druk de pen stevig op de huid om de injectie te starten.
- Tijdens het injecteren hoort u de pen twee keer klikken; de eerste klik geeft aan dat de injectie gestart is, de tweede dat de injectie bijna voltooid is.



- Blijf de pen stevig tegen de huid drukken, totdat u ziet dat de groene indicator het venster vult en niet meer beweegt.



- Trek daarna de voorgevulde pen rechtop van de injectieplaats.
- Druk een gaasje gedurende 10 seconden op de injectieplaats totdat het eventuele bloeden is gestopt. Wrijf niet op de injectieplaats, breng eventueel een pleister aan.
- Gebruik de voorgevulde pen nooit opnieuw!
- Gooi, na het injecteren, de gebruikte voorgevulde pen direct in de speciale container.