

Subcutane provocatietest

Toestemmingsformulier/informed consent

Onze testen worden uitgevoerd conform (inter)nationale wetenschappelijke richtlijnen. Het doel is dat de test betrouwbaar, goed en zo veilig mogelijk verloopt. Daarom is ook uw informatie en medewerking belangrijk.

We informeren u zo goed mogelijk over deze test, zodat u weet wat de mogelijke voor- en nadelen en gevaren van de test zijn. Ook wat de alternatieven ervoor zijn. Uw internist-allergoloog zal dit met u bespreken. Als de informatie duidelijk begrepen is en uw toestemming is verkregen, kan het onderzoek of de behandeling plaatsvinden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek allergologie, telefoonnummer 088 708 52 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

De subcutane provocatietest

Voordelen

De test kan in veilige omgeving aantonen of u wel of niet allergisch reageert op onderhuidse injectie van het geteste middel, bijvoorbeeld een verdovingsvloeistof.

Als er geen reactie is opgetreden bij deze test, dan is er geen verhoogde kans meer op een reactie bij een volgend gebruik van het geteste middel.

Het is dan niet langer nodig om dit middel te vermijden. Als er wel een reactie optreedt dan zal uw internist-allergoloog beoordelen of het een allergische reactie is of niet. Behandeling kan nodig zijn. Er volgt een advies ter voorkoming van volgende reacties in de toekomst. Bij ernstige reacties op het geteste middel zullen we het levenslang verbieden ter voorkoming van een volgende reactie. We documenteren de opgetreden reactie verschijnselen en/of allergie in uw dossier, zodat toekomstige behandelaars kunnen zien dat u op dit middel gereageerd heeft.

Risico's en nadelen

Bij een subcutane provocatietest kan de patiënt flauwvallen. Deze mensen worden dan tijdens de test bleek, klam en duizelig door een angstreactie van het lichaam op een prik. De arts kan dan geruststellend optreden.

Zeer zelden kan een ernstige onmiddellijke allergische reactie op: 'anafylaxie' genaamd, optreden.

Anafylaxie is een ernstige onmiddellijke levensbedreigende allergische reactie. Hierbij ontstaat jeuk over het hele lichaam, roodheid en zwellingen van de huid en ademhalingsproblemen door zwelling van de keel, die de luchtweg belemmert, jeukende ogen, niezen, benauwdheid, hoesten, piepen en benauwdheid door astma, sufheid, wegvallen, snelle hartslag en bloeddrukdaling. Misselijkheid met spugen en buikkrampen kunnen daarbij ook optreden. Omdat deze reacties binnen een half uur na de toediening kunnen optreden en dan onmiddellijke levensreddende behandeling nodig is, moet u altijd gedurende minimaal een half uur na het einde van de test in de wachtkamer blijven (!!).

Zodra u merkt dat u klachten krijgt van huid, neus, ogen of longen, of wanneer u zich niet lekker gaat voelen, moet u dit direct aan de secretaresse in de wachtkamer of één van onze assistenten melden.

Bij klachten zal de assistente direct uw behandelend internist-allergoloog waarschuwen. Deze kan de klachten goed behandelen, en zal zo nodig u een levensreddende behandeling met onder andere adrenaline geven.

Daarom mag u tijdens de test de polikliniek allergologie niet verlaten en dient u in de wachtkamer onder toezicht van het secretariaat te blijven. Wilt u naar het toilet, dan dient u de secretaresse vooraf hiervan op de hoogte te stellen.

Vertraagde anafylactische reacties (nadat u het ziekenhuis heeft verlaten) zijn nog zeldzamer. Mocht dit toch wel het geval zijn, dan moet u 112 bellen.

Bij de provocatietest mag uw gezondheidstoestand niet verslechterd zijn, in vergelijking met het moment dat de arts het onderzoek met u afsprak. Is deze wel verslechterd, overleg eerst met ons secretariaat. Zwangerschap is ook een reden om de test niet te doen, vanwege de kans op anafylaxie.

Belangrijk en essentieel is, dat u gedurende 2 á 3 dagen voorafgaand aan de test medicijnen moet stoppen, die de testuitslag verstoren of eventueel allergische reacties verergeren en/of de anafylaxie behandeling met adrenaline belemmeren.

Op bijgevoegd formulier staan welke medicijnen u voorafgaand aan de test tijdelijk moet laten staan, en hoe lang u dit van te voren moet laten staan. Het tijdelijk stoppen van medicijnen moet u in overleg doen met uw internist-allergoloog.



Toestemming subcutane provocatietest

Ondergetekende patiënt verklaart dat hij/zij

- 1. de informatie over deze test begrepen heeft;
- 2. de voor- en nadelen, de eventuele risico's en alternatieven besproken zijn;
- 3. vrijwillig instemt met het ondergaan van deze test;
- 4. de poli tijdens en vlak na de test niet zal verlaten.

Datum: Plaats:

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening:

N.B. Bij minderjarigen dient één van de ouders/verzorgers dit formulier te ondertekenen.

