

# Hoe gaat de behandeling van de carboplatin/paclitaxel/ ipilimumab/nivolumab kuur

U begint met een combinatietherapie bestaande uit chemotherapie en immunotherapie. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **C**arboplatin (chemotherapie)
2. **P**aclitaxel (chemotherapie)
3. **I**pilimumab (immunotherapie)
4. **N**ivolumab (immunotherapie)

## Verloop

De kuur krijgt u om de drie weken. De eerste twee kuren bestaan uit immunotherapie in combinatie met chemotherapie.

Vanaf de derde kuur krijgt u alleen nog immunotherapie. Hierbij krijgt u om de week twee middelen.

1 <sup>e</sup> kuur	Carboplatin / Paclitaxel Ipilimumab /Nivolumab
2 <sup>e</sup> kuur	Carboplatin / Paclitaxel Nivolumab
3 <sup>e</sup> kuur	Ipilimumab / Nivolumab <i>(vanaf de derde kuur elke oneven kuur 2 middelen immunotherapie)</i>
4 <sup>e</sup> kuur	Nivolumab <i>(vanaf de vierde kuur elke even kuur 1 middel immunotherapie)</i>

## Hoe krijgt u de medicatie:

U krijgt de medicijnen via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT Hengelo.

Om te zorgen dat u geen allergische reactie krijgt op paclitaxel krijgt u vooraf medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De totale toediening duurt ongeveer vier uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 [facebook.com/zgtinfo](http://facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](http://linkedin.com/company/zgt)

 [twitter.com/zgt\\_info](http://twitter.com/zgt_info)

 [youtube.com/user/zgtinfo](http://youtube.com/user/zgtinfo)

### **Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:**

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen. Deze klachten kunnen een aantal dagen duren. Wanneer het nodig is mag u maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee tot drie weken na de eerste behandeling. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Wanneer u een pruik wilt kunt u hiervoor een machtiging vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten chemotherapie kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

### **De bijwerkingen van ipilimumab/nivolumab staan in de bijgeleverde folder en waarschuwingskaart.**

*Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.*

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).