

# Osteomyelitis

In deze folder vindt u informatie over osteomyelitis.

## De aandoening

Osteomyelitis is een infectie van het bot, beenmerg en beenvlies die door bacteriën wordt veroorzaakt.

Deze bacterie kan ten gevolge van een infectie ergens anders in het lichaam door het bloed worden meegenomen naar het bot. Daarnaast kan tijdens een operatie of door een open wond een bot rechtstreeks worden besmet. Tevens kan osteomyelitis ontstaan door infectie van nabijgelegen weefsel, bijvoorbeeld een abces. Osteomyelitis kan acuut ontstaan, maar ook in langdurige vorm optreden (chronische osteomyelitis).

## Symptomen

De meest voorkomende verschijnselen zijn koorts en pijn aan het aangedane lichaamsdeel. Bij bewegen of belasten neemt de pijn toe. Ook bij het aanraken van het ontstoken gebied neemt de pijn toe. Andere klachten zijn zwelling, roodheid, koorts, malaise en prikkelbaarheid in het aangedane gebied.

## Diagnose en onderzoek

De diagnose osteomyelitis wordt gesteld op basis van de klachten, het lichamelijke onderzoek, de medische voorgeschiedenis en, indien noodzakelijk, aanvullend onderzoek. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit inspectie van het voor osteomyelitis verdachte gebied en zoeken naar fistelgangen.

Veelal worden er bij bloedonderzoek ontstekingsverschijnselen gevonden. Dit is echter niet altijd het geval. Door middel van een kweek van het bloed maar beter door het kweken van het ontstoken bot weefsel zelf kan vastgesteld worden welke bacterie de infectie veroorzaakt.

Aanvullend onderzoek begint vaak met het maken van een röntgenfoto en kan uitgebreid worden met verschillende soorten scans.

## Behandeling

De ontsteking kan onderdrukt en behandeld worden met antibiotica. Meestal is een operatie noodzakelijk gevolgd door een behandeling met antibiotica.

De behandeling met antibiotica is vaak langdurig (maanden).

Bij chronische osteomyelitis is het belangrijk de oorzaak te achterhalen en die te behandelen. Welke veelal bestaan uit meerdere operatieve behandelingen.

## Risico's/complicaties van een operatieve behandeling zijn onder andere

- Nabloeding
- Pijn
- Misselijkheid
- Koorts
- Zwelling
- Een recidiverende infectie
- Zeldzaam zijn: Pathologische fracturen (spontaan ontstane botbreuken)

## Ontslag

Wanneer u met ontslag gaat, krijg u de nodige papieren mee. Indien er een vervolgspraak noodzakelijk is, wordt deze thuisgestuurd.

## Vragen

Bij vragen of complicaties kunt u tot zes weken na opname tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat heelkunde van ZGT, telefoonnummer 088 708 52 33. Na zes weken kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

Bij zeer dringende gevallen, welke echt niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunt u buiten kantoor tijd tot twee weken na ontslag contact opnemen met ZGT, telefoonnummer 088 708 78 78. Na twee weken kunt u buiten kantoor tijden contact opnemen met de huisartsenpost.

Indien u een operatieve behandeling heeft gehad, neemt u na de operatie bij één van onderstaande klachten direct contact op volgens hierboven genoemde wijze.

- Koorts (38,5 °C en hoger)
- Nabloeding
- Zwelling
- Aanhoudende pijn

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).